

**ОТЧЕТ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ
КОНФЕТ МОЛОЧНЫХ ОБОГАЩЕННЫХ «ЛАКТОМИЛК»**

Н.В. ХУДЯКОВА, врач высшей категории, доцент кафедры госпитальной педиатрии СГМУ, г. Томск

Проблема рационального питания имеет не только медицинское, но и большое социальное значение, т.к. является определяющим фактором гармоничного развития и здоровья человека. Особую актуальность приобретают вопросы питания у детей, в связи с интенсивными процессами роста, свойственной им подвижностью, значительным умственным напряжением. В то же время низкий материальный уровень в большинстве семей не позволяет им питаться правильно и обеспечивать организм необходимым количеством нутриентов и энергией. Даже у людей с рациональным питанием выявляются количественные и качественные нарушения микробиоценоза, что может быть вызвано изменениями окружающей среды (вода, продукты питания). У детей уже само несоответствие диеты возрасту ведет к нарушению биоценоза. У большинства людей дисбактериоз развивается вследствие одностороннего характера питания (у большинства – это углеводистый характер), других нарушений принципов рационального питания, а также как следствие перенесенных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта или приема фармакологических препаратов (особенно антибиотиков и сульфаниламидов).

В клинической практике давно назрела потребность в продуктах с заданным, модифицированным в определенных направлениях составом. Это необходимо для разработки адекватных лечебных диет с учетом патогенетических и метаболических особенностей организма больного.

Целью нашего исследования было изучить влияние конфет молочных обогащенных ЛАКТОМИЛК на качественный и количественный состав микрофлоры кишечника у детей, имеющих дисбактериоз.

Конфеты молочные обогащенные ЛАКТОМИЛК представляют собой прессованные конфеты, содержащие в своем составе комплекс микроорганизмов-эубиотиков.

Бета-каротин является предшественником витамина А и выполняет функцию антиоксиданта, обеспечивая защиту клеточных мембран от разрушительного действия свободных радикалов. Превращаясь в организме в витамин А, он регулирует рост костей, участвует в формировании межклеточного вещества, коллагеновых и эластических волокон соединительной ткани, гладкой мускулатуры сосудов, регулируют восстановление и полноценное функционирование эпителия кожи и всех слизистых оболочек, участвует в формировании зрительных ферментов.

Молочнокислые бактерии (*Lactobacillus plantarum* штам 8Р-А3), попав в желудочно-кишечный тракт, легко размножаются, восстанавливая естественное микробное равновесие в кишечнике, регулируя его работу. Лактобактерии способствуют нормализации синтеза витаминов В, Е, К, аскорбиновой кислоты, повышая тем самым резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, поддерживают естественную защиту от бактерий и вирусов, создают благоприятные условия для размножения и роста «полезных» микроорганизмов, препятствуют внедрению болезнетворных микроорганизмов, способствуют про-

цессам ферментативного переваривания белков, липидов, высокомолекулярных углеводов, повышают перистальтику кишечника, нормализуя эвакуацию его содержимого.

Материалы и методы исследования

Исследования проводились у 12 детей разного пола и возраста, в патогенезе заболеваний которых присутствовал дисбактериоз кишечника.

В клинической картине это проявлялось нарушением аппетита, отрыжкой, явлениями метеоризма, болями по ходу кишечника, учащенным и разжиженным плохо переваренным стулом. В анализе кала на состав микрофлоры кишечника полностью отсутствовала лактофлора. По возрасту и полу дети распределялись следующим образом:

Возраст	от 3 до 7 лет		от 7 до 12 лет		от 12 до 16 лет	
Пол	м	д	м	д	м	д
Число пролеченных детей	4	4	2	1	1	-

Дети находились под наблюдением в течение 1 месяца. Чтобы не ухудшать аппетит, конфеты давались в перерывах между основными приемами пищи. Все дети принимали конфеты с большим желанием, как лакомство, отмечали их приятный сладковатый вкус, им нравились и цвет, и запах конфет, а также то, что они не крошатся и не липнут к рукам. Младшие дети их разжевывали, старшие чаще рассасывали. Ни у одного не отмечалось тошноты, рвоты, либо отрыжки. Переносимость продукта была хорошей у 100% наблюдавшихся детей. Побочных действий в виде аллергических реакций и других изменений также не отмечалось.

По истечении одного месяца приема конфет ЛАКТОМИЛК у всех детей произошла положительная динамика клинической картины: исчезли симптомы диспепсического, астеновегетативного и болевого синдромов. Стул стал регулярным, переваренным, без патологических примесей. В анализе кала на дисбактериоз появились лактобактерии. Таким образом, у 100% обследованных детей, принимавших конфеты ЛАКТОМИЛК, отмечено улучшение в состоянии, а также показателях параклинического обследования.

Результаты исследований позволяют рекомендовать применение конфет ЛАКТОМИЛК широкому кругу больных, в патогенезе заболевания которых присутствует дисбактериоз, а так же для профилактики его при назначении фармакологических препаратов.

Рекомендуемый способ применения: детям до 7 лет – 2-3 конфеты в день; от 7 до 12 лет – 3-4 конфеты в день; подросткам – 4-5 конфет в день.

Конфеты принимаются в перерывах между основными приемами пищи. Удобство, эффективность, а также желание детей позволяют рекомендовать ЛАКТОМИЛК в качестве дополнительного лечебно-профилактического питания.