

## ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ИВЛАКСИН» У ЛИХОРАДЯЩИХ ДЕТЕЙ

Областная детская клиническая больница, г. Курск

Под наблюдением в ОДКБ находилось 15 детей с синдромом постоянной или интермиттирующей лихорадки. Из них 5 детей с ревматическими заболеваниями, 6 детей с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыводящей системы, 4 ребенка с постинфекционным субфебрилитетом на фоне хронических очагов инфекции и синдрома вегетососудистой дистонии (ВСД).

В группе было одинаковое количество мальчиков и девочек. Возраст детей – от 9 месяцев до 15 лет. Биологически активная добавка (БАД) ИВЛАКСИН (компании АРТ ЛАЙФ) назначался совместно с комплексной терапией основного заболевания как вспомогательное средство. Подобрана группа больных с длительными температурными реакциями, получавших комплексную медикаментозную терапию 2-4-6 недель до назначения ИВЛАКСИНА и сохраняющей температурной реакцией и интоксикацией.

ИВЛАКСИН назначался в возрастной дозе в течение 2-3 недель. Результаты представлены в таблице.

№	Симптомы	До назначения Ивлаксона	С улучшением синдрома	С исчезновением синдрома	Без эффекта	Побочные реакции
1	Интоксикация	15	5	9	1	
2	Болевой синдром	9	1	8	-	
3	Температурная реакция	15	2	12	1	
4	Отечность суставов	5	1	3	1	
5	Лейкоцитоз	13	4	9	-	
6	Ускоренная СОЭ	11	2	8	1	
7	СРБ	9	1	7	1	
8	Сиаловые кислоты	8	1	6	1	
9	Лейкоцитурия	3	-	3	-	
10	Протеинурия	2	1	1	-	

### Выводы:

1. Препарат ИВЛАКСИН обладает умеренным дезинтоксикационным, общеукрепляющим, противовоспалительным и антипиретическим действиями.

2. У длительно лихорадящих детей ИВЛАКСИН способствует снижению, нормализации температуры, приводит к уменьшению суточного размаха температуры у септических больных (3 наблюдения).

3. У всех детей прием ИВЛАКСИНА способствовал улучшению самочувствия, повышению аппетита, стойкому уменьшению болевого синдрома и воспалительных проявлений в лабораторном контроле.

Для дальнейших выводов у длительно лихорадящих больных, видимо, необходимо использовать более высокие дозы и пролонгированные курсы лечения.

*Арт Лайфс*

**Примечание:** рекомендуемые возрастные дозы препарата ИВЛАКСИН: дети до 1 года – по 1/4 таблетки 2 раза в день желательно во время кормления; дети 1-3 лет – по 1/3 таблетки 3 раза в день курсом 5-10 дней; дети 4-10 лет – по 1/2 таблетки 2-3 раза в день курсом до 2-х недель; дети 11-14 лет – по 1 таблетке 2 раза в день курсом 2-3 недели.

Препарат принимать за 15-30 минут до еды.