

**ОПЫТ РАБОТЫ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ
КОМПАНИИ «АРТ ЛАЙФ» ПРИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
И ЛЯМБЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ**

Л.И. ЛЕШКОВА, г. Минусинск

Наиболее успешный результат получен нами при применении биологически активных добавок (БАД) компании АРТ ЛАЙФ в лечении бронхолегочной патологии. Так, в период с декабря 2000 по январь 2001 года было пролечено 9 больных детей с диагнозом острый бронхит, из них 5 детей получали только биологически активные добавки, такие как ИВЛАКСИН, ПУЛЬМОКЛИНЗ, ГРИН СТАР (в острый период), а затем ТОКСФАЙТЕР, ЛЕЦИТИН, АЦИДОБАК и БИФИДОБАК. У этих детей температура нормализовывалась к концу первых суток применения препаратов. Разрешение процесса, то есть появление продуктивного кашля, хороший дренаж происходило на второй день приема добавок, нормализация общего состояния – на 3-4 день лечения.

Остальные четверо детей лечились традиционно, т.е. получали антибактериальную терапию, препараты, разжижающие мокроту, обеспечивающие дренаж, витаминотерапию. У этих больных температура держалась 2-3 дня, а продуктивный кашель появлялся только на 4-5 день лечения. Самочувствие улучшалось к 7 дню. Таким образом, применение БАД сократило длительность острого периода с 5-7 до 2-3 дней, а реабилитации – в два раза.

Наблюдения показали, что дети, принимавшие биологически активные добавки в качестве иммуномодуляторов и витаминных препаратов, стали значительно реже болеть, даже в период подъема ОРЗ и гриппа.

Хорошие результаты получены также при лечении детского лямблиоза. На участке пролечено 23 случая лямблиоза; 20 детей принимали следующие БАД: ТОКСФАЙТЕР, ГРИН СТАР, ЛЕЦИТИН, ГЕПАТОН, АЦИДОБАК, БИФИДОБАК (по схеме), а также желчегонный сбор трав, дюбажи. Повторное обследование показало отрицательные результаты анализов. При этом было отмечено значительное улучшение самочувствия детей в целом, в частности, они меньше болели ОРЗ. Три ребенка лечились традиционно: применялись трихопол, фуразолидон, было проведено два курса макмирора без предварительной подготовки. В контрольных анализах были вновь выявлены цисты лямблий и живые особи.

Примечание: рекомендуемые возрастные дозы БАД АЦИДОБАК, БИФИДОБАК: дети до 7 лет – по 1 капсуле 1 раз в день; дети старше 7 лет – по 1 капсуле 2 раза в день за 30-40 минут до еды. Курс лечения 1 месяц.