

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «НЕЙРОСТАБИЛ» У ДЕТЕЙ

Областная детская клиническая больница, г. Курск

В настоящее время отмечается значительный рост числа неврологических заболеваний у детей. Ухудшение экологической ситуации, различные эндо- и экзоинтоксикации, рост социально-экономической напряженности в стране и в каждой отдельной семье, информационные перегрузки ведут к невротизации детского населения. Даже у практически здоровых детей стали обычными следующие симптомы: головные боли, нарушения сна, раздражительность, плаксивость, гиперактивность. Еще более выраженная симптоматика неврастения, церебрастении отмечается у больных детей.

В нашей больнице проводилось наблюдение за группой детей с различными неврологическими нарушениями.

№	Симптомы	У детей с соматической патологией		У детей с резидуальной энцефалопатией	
		До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
1	Головная боль	72%	4%	75%	15%
2	Вялость	37%	1%	38%	4%
3	Слабость	33%	0,5%	37%	2%
4	Раздражительность	44%	5%	49%	5%
5	Плаксивость	13%	0,5%	17%	0,8%
6	Головокружение	26%	3%	31%	4%
7	Повышенная возбудимость	49%	2%	45%	3%
8	Трудное засыпание	86%	4%	52%	5%
9	Ночные страхи	67%	1%	46%	4%
10	Прерывистый сон	48%	2%	42%	3%
11	«Неэффективный сон»	79%	-	23%	0,5%
12	Перепады настроения	48%	-	17%	-
13	Метеозависимость	27%	4%	29%	5%
14	Нарушение памяти и внимания	9%	-	13%	-
15	Заикание	-	-	1%	-
16	Тики	-	-	1%	-
17	Нарушение сердечного ритма (тахикардия, экстрасистолия)	8%	-	14%	-
18	Колебания АД	56%	5%	39%	1%

Всего наблюдалось 37 детей, из них девочки – 21, мальчики – 16, возраст детей от 1 до 16 лет. У 17 детей неврологическая симптоматика отмечалась на фоне резидуальной энцефалопатии, у 20 – как проявления астеноневротического синдрома на фоне различных соматических заболеваний. Все дети этой группы получали для коррекции неврологических симптомов биологически активную добавку (БАД) НЕЙРОСТАБИЛ (компания АРТ ЛАЙФ) в течение 2 недель в возрастной дозировке, без дополнительного использования седативных

препаратов. Группа сравнения – 32 человека: 21 девочка, 11 мальчиков, возраст от 1 до 15 лет – получала традиционное медикаментозное лечение.

Все дети полностью обследованы, проконсультированы невропатологом до и после курса лечения. Предварительные результаты показывают высокую эффективность препарата, его экономичность (монотерапия сравнима по эффективности с комплексной медикаментозной терапией). Отсутствие побочных эффектов, натуральное происхождение сырья, оптимальное соотношение цена/эффективность делают препарат предпочтительным в неврологической практике.

Примечание: рекомендуемые возрастные дозы препарата НЕЙРОСТАБИЛ:

дети до 1 года – по 1/4 таблетки 2 раза в день перед сном курсом 5-10 дней;

дети 1-3 лет – по 1/3 таблетки 2-3 раза в день курсом 5-10 дней;

дети 4-10 лет – по 1/2 таблетки 2 раза в день курсом до 2-х недель;

дети 11-14 лет – по 1/2-1 таблетке 2 раза в день курсом 1 месяц.

Принимать до еды.