

## СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КОНЪЮГАЦИОННЫХ ЖЕЛТУХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Е.А. УСАЧЕВА, медакадемия им. Н.Н. Бурденко, кафедра неонатологии, г. Воронеж

Рост числа конъюгационных желтух (КЖ) у новорождённых и увеличение доли тяжёлых форм КЖ заставляет практического врача искать новые эффективные и недорогие методы лечения.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности использования ТОКСФАЙТЕРА и ЛОХЕИНА\* при лечении новорождённых детей, в сравнении с традиционно используемыми препаратами.

Пролечено 119 детей, находившихся в областной детской больнице г. Воронежа. Дети рождены в сроке 29-41 недели, паспортный возраст от 3 до 30 дней. У всех детей отмечалась конъюгационная желтуха на фоне энцефалопатии. У 76 человек уровень свободного билирубина был ниже 300 ммоль/л, а у 43 – превышал 300. Все больные получали фитотерапию в прерывистом режиме, фенobarбитал, сульфат магния внутрь, витамин Е внутримышечно и инфузионную терапию.

Детям контрольной группы (64 человека) в качестве энтеросорбента назначался карболен в дозе 0,5 г/кг в сутки, в качестве гепатопротектора детям с тяжёлой желтухой – эссенциале внутривенно 1 мл в сутки.

В основной группе (55 детей) впервые были использованы два препарата компании АРТ ЛАЙФ – энтеросорбент ТОКСФАЙТЕР на основе растительной клетчатки, обогащённый эубиотиками и растительными ферментами (в дозе 1/4 капсулы 2 раза в день в 10 мл кипячёной воды) и гепатопротектор ЛОХЕИН (экстракт солянки холмовой) в виде однопроцентного водного раствора в 10 мл 2 раза в день. Препараты принимались детьми между кормлениями в течение 5 дней.

У детей основной группы на 5 дней раньше исчезла желтуха и такие симптомы, как вялость и срыгивания, нормализовался аппетит. Несмотря на достаточно большие дозы ТОКСФАЙТЕРА и ЛОХЕИНА, никаких нежелательных побочных эффектов не наблюдалось.

Таким образом, использование ТОКСФАЙТЕРА и ЛОХЕИНА позволило быстрее уйти от критических цифр билирубина, свести к минимуму продолжительность инфузионной терапии и значительно удешевить лечение.

Рационализаторское предложение № 2456 от 05.05.00 ВГМА

**\*Примечание:** БАД ЛОХЕИН выпускается в жидкой форме ГЕПАТОН для удобства применения в детской практике.